

Steve Sisolak  
Governor



Richard Whitley, MS  
Director

**DEPARTMENT OF  
HEALTH AND HUMAN SERVICES**  
DIVISION OF PUBLIC AND BEHAVIORAL HEALTH  
*Helping people. It's who we are and what we do.*



Lisa Sherych  
Administrator

Ihsan Azzam,  
Ph.D., M.D.  
Chief Medical Officer

## Boletín Técnico

**Fecha:** Actualizado el 3 de septiembre 2021. Boletine Técnico Original 15/1/21 y primera actualización 15/07/21

**Tema:** Recomendaciones actualizadas para las pruebas de tuberculosis (TB) en torno a las vacunas COVID-19

**Contacto:** Susan McElhany, DMD, División de Salud Pública y Comportamiento Programa de Salud contra TB, Oficina de Salud Pública de Investigaciones y Epidemiología, [smcelhany@health.nv.gov](mailto:smcelhany@health.nv.gov)

**A:** Proveedores de Salud de Nevada, Instalaciones de Salud, Departamentos de Salud Pública, Instalaciones Correccionales, Prevencionistas contra Infecciones, y Departamentos sobre el Control de Infección

---

### Situación:

El 31 de agosto 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) actualizó sus orientaciones provisionales sobre las consideraciones clínicas para el uso de las vacunas COVID-19 e incluyó orientaciones sobre el momento de realizar las pruebas de tuberculosis (TB) (véase la sección "Pruebas de laboratorio" en las orientaciones completas de los CDC). Las consideraciones clínicas actualizadas de los CDC pueden consultarse en <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>.

**Actualización:** Los CDC recomiendan ahora la realización de pruebas de tuberculosis, como la prueba cutánea de tuberculosis o la prueba de liberación de interferón gamma (IGRA), sin tener en cuenta el momento de la vacunación COVID-19.

- Las pruebas para detectar la infección de tuberculosis pueden realizarse antes, durante o después de la vacunación contra COVID-19.
- Se sigue haciendo hincapié en no retrasar la vacunación contra el COVID-19.
- La anterior orientación provisional de administrar la prueba de la tuberculosis  $\geq$  cuatro semanas después de la finalización de cualquier vacunación con COVID-19 se recomendó por exceso de precaución, dada la novedad de estas vacunas. La División de Salud Pública y de Comportamiento de Nevada está de acuerdo con estas recomendaciones.

### Recursos:

Códigos administrativos de Nevada relacionados con las pruebas de tuberculosis, NAC 441A.370-380:

<https://www.leg.state.nv.us/NAC/NAC-441A.html#NAC441A>

Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la tuberculosis:

<https://www.cdc.gov/tb/default.htm>

Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la vacunación COVID-19:

<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html>

División de Salud Pública y Comportamiento de Nevada: <http://dpbh.nv.gov/>


---

*Preguntas:*

*Para Orientación actualizada, Por favor, revise el sitio web del Boletín Técnico del DPBH y el sitio web de respuesta sanitaria de Nevada con regularidad.*



Lisa Sherych, Administradora  
División de Salud Pública y Comportamiento



Ihsan Azzam, Ph.D., M.D.  
Oficial Jefe Médico